

Dekeyser PL. 1950. Guepard: Contribution a l'etude de l'Aïr (Mission L. Chopard et A. Villiers). Memoires de l'IFAN 10:402.

Keywords: 1NE/Acinonyx jubatus/Aïr/cheetah/distribution/field work/mammal/research/West Africa

Abstract: Dekeyser provides a checklist of mammals of Aïr (Niger) from zoological samples collected during several scientific field surveys. A specimen of cheetah has been collected near Aourarene, north west to Baguezans mountain.

Dans ce rapport, Dekeyser fournit une liste des mammifères de l'Aïr (Niger) réalisée à partir d'échantillons zoologiques collectés au cours de plusieurs missions scientifiques. Un spécimen de guépard a été collecté près de Aourarene, au nord ouest de la montagne de Baguezans.

MÉMOIRES DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE

N° 10

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'AÏR



PARIS (Ve)
LIBRAIRIE LAROSE
11, rue Victor-Cousin, 11

1950

Fam. MUSTELIDAE

18. *Ictonyx libyca rothschildi* (THOMAS et HINTON)

Syn. : *Poecilictis rothschildi* THOMAS et HINTON, *Novit Zool.*, vol. XXVIII, 1921, p. 5.

2 spécimens :

1. — ♂ juv., Agadez, 25 juillet 1947, CG. IFAN 47-10-143.

2. — ♀ juv., Agadez, 3 août 1947, CG. IFAN 47-10-144.

LOCALITÉS. — Type : Farniso près Kano, Nigeria (BUCHANAN, 1^{er} voyage). — Dankaba, Nigeria ; Tessaoua, Soudan français (BUCHANAN, 2^e voyage). — Tombouctou (H. MADSEN). — Agadez (L. CHOPARD et A. VILLIERS).

Ce Zorille, classé par THOMAS et HINTON dans un genre particulier, n'avait pas été signalé jusqu'ici en bordure de l'Air. Malheureusement, les spécimens récoltés dans cette région étant très jeunes, il nous a été difficile d'apprécier certains de leurs caractères (en particulier les caractères crâniens que THOMAS et HINTON (1) n'ont d'ailleurs fait que signaler très succinctement). Cependant, il existe quelques poils sur les soles palmaires et plantaires et les rayures longitudinales sont décomposées sur la partie postérieure du dos. Nous assimilons donc ces Zorilles à la sous-espèce *Ictonyx libyca rothschildi*. Nous considérons que les caractères qui séparent cet animal des Zorilles du genre *Ictonyx* ne semblent pas devoir exiger le cadre d'un genre particulier. Rappelons d'ailleurs que BRAESTRUP (2) ne donne à *Poecilictis* que la valeur d'un sous-genre.

19. *Mellivora Buchanani* THOMAS

LOCALITÉS. — Type : Rivière Elmiki, Air, 2.100 pieds (640 m.), Rivière Tararé, Air, 2.700 pieds (820 m.). (BUCHANAN, 2^e voyage). — N.-W du Pic de Tiemarat, Air (Commandant CHAPPELLE, *in litt.*).

Fam. FELIDAE

20. *Acinonyx jubatus* (SCHEREBER)

LOCALITÉS. — Air, Irazet-n-Agadez (H. LHOÏE). Région d'Aourarène, N.-W. des Monts Baguezans (Commandant CHAPPELLE, *in litt.*).

21. *Caracal caracal poecilotis* THOMAS et HINTON

Tamacheq : *tiggit allarat*.

1 spécimen, ♀, Kori Tessanaouta, 6 septembre 1947, CG. IFAN 47-10-140.

MENSURATIONS :

Tête + corps	710 mm.
Queue	280 —
Oreille	80 —
Hauteur au garrot	370 —
Pied antérieur	100 —

(1) THOMAS (O.) et HINTON (M. A. C.). — On the group of African Zorils represented by *Ictonyx libyca*, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9), vol. V, 1920, pp. 367-369.

(2) BRAESTRUP, 1935, p. 98.