

Dekeyser PL. 1955. Le guepard. In:Dekeyser PL, editor. Les mammiferes de l'Afrique noire française. Dakar: IFAN; p 287-288.

Keywords: 1Afr/Acinonyx jubatus/cheetah/distribution/habitat/morphology/report/west africa

Abstract: The author refers to the work published by Bigourdan et Prunier (1937) to report that cheetahs mainly range in the Sahelo-saharian area (north to 13° North), but might be found in the wooded soudanese area south from this latitude.

L'auteur se réfère au travail publié par Bigourdan et Prunier (1937; Ref ID:38) pour rapporter que les guépards sont principalement répartis dans la région sahélo-saharienne (nord du 13° de latitude nord), mais devraient aussi se trouver dans les régions boisées soudaniennes au sud de cette latitude.

206.326

INSTITUT FRANÇAIS D'AFRIQUE NOIRE

INITIATIONS AFRICAINES

I

(2^e édition)

**LES MAMMIFÈRES
DE L'AFRIQUE NOIRE
FRANÇAISE**

Par P. L. DEKEYSER



I. F. A. N. — DAKAR

1955



Le Guépard *Acinonyx jubatus* (SCHREBER) (fig. 198) s'écarte, par sa morphologie des Félidés typiques. Alors que les Lions, les Léopards, les Chats, sont construits pour la chasse à l'affût, le Guépard est, en effet, construit pour la chasse à courre : corps plus svelte, membres allongés rappelant plus ceux d'un Canidé que d'un Félin. Sa vitesse peut d'ailleurs dépasser 100 km. à l'heure.


La taille d'un Guépard adulte atteint 1 m. 10 de longueur sans la queue et son poids peut être de 40 kg.

L'habitat de cet animal dans l'Ouest africain est surtout saharien et sahélien, mais d'après BIGOURDAN et PRUNIER, il s'aventure parfois dans la zone soudanienne. Bien que peu commune, l'espèce est distribuée en Afrique méridionale et orientale et depuis le Sud de la Mauritanie jusqu'à l'Inde. Sous-espèces :

— 288 —

Acinonyx jubatus hecki HILZHEIMER : Sénégal (plus probablement : Sud de la Mauritanie). — *A. j. soemmeringi* (FITZINGER) : du Nord de la Nigeria au Kordofan.

C'est un animal moins nocturne que le Léopard. Il se nourrit d'Oiseaux et de Mammifères, notamment de Lièvres et de petites Antilopes, mais VERHEYEN l'a vu du Parc de l'Upemba, s'attaquer à un jeune Hippotrague détaché d'un troupeau.



PL. D. 55.

FIG. 198. — Le Guépard, *Acinonyx jubatus* (SCHREBER).

La durée de la gestation est d'environ 95 jours. Les portées comportent de 2 à 4 petits.

La rapidité du Guépard et la facilité de son apprivoisement l'ont fait jadis employer à la chasse en Perse et dans l'Inde. Ses services ne semblent pas avoir été utilisés ainsi en Afrique occidentale.