

Dupuy AR. 1967. Répartition actuelle des espèces menacées de l'Algérie: Cheetah. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc 47(3&4):358-69.

Keywords: 1DZ/Acinonyx jubatus/cheetah/distribution map/North Africa/range/Sahara/status/ Tassili

Abstract: The cheetah formerly ranged over a large part of Algerian Sahara and Atlas high plateau. By 1967, their range was limited to Hoggar, Tassili N'Ajjer and Tindouf area, where cheetah was uncommon. A distribution map of cheetah is provided.

Le guépard était auparavant réparti sur une grande partie du Sahara algérien et le haut plateau de l'Atlas. En 1967, sa répartition était limitée au Hoggar, au Tassili N' Ajjer et à la région de Tindouf, où il était rare. Une carte de répartition du guépard est fournie.

6. Chat de marais *Felis chaus*


Bien que la systématique des chats soit encore très embrouillée et que « *in Natura* » les déterminations soient difficiles, la présence du Chat de marais au Hoggar reste certaine.

En effet, un spécimen a été capturé par Meinertzhagen en 1930 dans les gorges d'Arak (contreforts nord du Hoggar). Cette espèce d'assez grande taille est normalement inféodée aux milieux humides ; bien que le Hoggar soit placé en pleine zone désertique il y existe (Arak notamment) des biotopes marécageux constants. Un Chat de cette espèce aurait été observé à la guelta d'Amguid au Tassili N'Ajjer ! Mais une confusion reste toujours possible avec la sous-espèce locale (*sarda*) du Chat de Libye. Précisons qu'à part la capture rapportée plus haut aucun Chat de marais n'a été capturé en Afrique, à l'exception de l'Egypte. Il y a là un problème de répartition géographique étonnant !

CARTE II : GUÉPARD, LYCAON, RATEL, LOUTRE.

7. Guépard *Acinonyx jubatus hecki* Hilzheimer

Ce bel animal qui a dû récemment encore habiter toute l'Afrique, ne se retrouve plus de nos jours qu'en petit nombre dans les zones figurées sur la carte, encore qu'il soit très rare dans la tache de Tindouf. Animal des steppes désertiques, le Guépard a été obligé de s'adapter à une nouvelle forme de vie. En effet, devant la chasse qui lui a été faite, il s'est réfugié dans les massifs sahariens (Hoggar, Tassili N'Ajjer). Là il est pratiquement obligé de chasser à l'affût, le terrain chaotique ne lui permettant pas de poursuivre ses proies. D'autre part, les Gazelles dorcas (*Gazella dorcas*), ses proies habituelles, sont très souvent remplacées par de jeunes Mouflons à manchettes (*Ammotragus lervia*), Damans des rochers (*Procavia ruficeps*) et autres mammifères habitants normaux des montagnes désertiques. Nous rejoignons les conclusions de J.B. Panouse lorsqu'il écrit que la présence du Guépard reste improbable de nos jours dans le Dra et les Kem-Kem (sud-est marocain). En effet, il semble certain que l'espèce ait disparu au nord d'une ligne qui passerait *grosso modo* par Tindouf - In Salah et remonterait à l'est vers Fort Flatters.



CARTE II

8. *Lycaon Lycaon pictus*

Après toutes nos recherches, il apparaît comme certain que le *Lycaon* n'habite plus les zones situées au nord du Hoggar. Nous avons représenté son habitat comme couvrant le sud du Hoggar, une bonne partie du Tassili N'Ajjer et les territoires situés au sud (Ténéré septentrional et oued Tafassasset). C'est dans ces zones que les dernières observations ont été faites par Th. Monod, H. Lhote, Heim de Balsac et autres auteurs.

Personnellement, comme nous l'avons écrit dans un précédent article (*La Faune menacée en Algérie et sa Protection (vide supra)*),