

Wassif K. 1995. Felidae in Egypt. In: Guide to Mammals of Natural Protectorates in Egypt. Kairo: Department of Natural Protectorates.

Keywords: 1EG/*Acinonyx jubatus*/Caracal caracal/cheetah/Felidae/*Felis chaus*/*Felis silvestris*

Abstract: Arabic guide to mammals of natural protectorates in Egypt.

Arab Republic of Egypt
 Cabinet of Ministers
 Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA)
 Department of Natural Protectorates



*Dr. Peter Jackson
 with my best Compliments*

K. Wassif



GUIDE TO MAMMALS OF NATURAL PROTECTORATES IN EGYPT

By
 Kamal Wassif
 Professor Emeritus of Zoology
 Faculty of Science, Ain Shams University, Cairo

Cairo, 1995

Order Carnivora	رتبة آكلات اللحوم
Fam. Felidae	فصيلة القطط
Chita, Hunting Leopard, " Fahd"	فهد صياد - شيتا

***Acinonyx jubatus* (Schreber, 1776)**

1776. ***Felis jubata*** Schreber, Die Saugeth., 3: 105

1804. ***Felis guttata*** Herman, Obs. Zool, 38

1902. ***Cynailurus jubatus*** Anderson, Zoology of Egypt : 185

1932. ***Acinonyx jubata*** Flower, P. Z. S. London: 392

1951. ***Acinonyx jubatus*** Ellerman & Morrison-Scott: 320

الفهد الصياد (شيتا) (شكل ٥٧) في حجم النمر تقريباً ، له رأس صغير كرأس القط وأرجل طويلة وجسم ممشوق كجسم الكلب . الأذنان صغيرتان وقصيرتان والذيل طويل . طول الرأس والجسم حوالي ١٣٥ سم . والذيل ٧٢ سم والأرتفاع عند الكتفين ٧٧ سم . لون الفراء على الجانبين وعلى الظهر والأسطح الخارجية للأرجل أصفر أو رملي باهت مع بقع سوداء كاملة الاستدارة .

الفراء على السطح البطني أبيض اللون . الجزء من الذيل القريب من الجسم كلون الجسم ، أما الثلث الطرفي منه فتظهر عليه حلقات وطرف الذيل أبيض اللون . يوجد بين الفم والعين على كل ناحية شريط أسود اللون .

والفهد الصياد حيوان البراري الأصيل الذي يعتمد في حياته على سرعته أكثر مما يعتمد على قوته فهو أسرع الثدييات للمسافات القصيرة إذ تصل سرعته إلى ١١٢ كيلو متراً في الساعة إلا أن الحصان يسبقه في المسافات الطويلة .

التوزيع العام للنوع : الهند - افغانستان - ايران - العراق - سوريا - الاردن - السعودية - مصر - المغرب - السودان - اثيوبيا - الصومال - شمال نيجيريا .

التوزيع بجمهورية مصر العربية : بدأت الانظار تتجه إلى الفهد الصياد بمصر اعتباراً من عام ١٩٦٨ حين سجله المؤلف (بالاشتراك مع الدكتور هاري هوستن والدكتور مكرم قيسرو الباحث إبراهيم حلمي) من عينة قتلها أحد رعاة الأغنام في مايو ١٩٦٧ إلى الشمال من العلامة ١٢٥ علي طريق مصر - أسكندرية الصحراوى ، إنقاًماً لمقتل خرافة والمعتقد أن اعداداً قليلة من الفهد الصياد توجد حالياً بالجزء الشمالي من الصحراء الغربية وخاصة حول منخفض القطارة .

رتبة آكلات اللحوم

فصيلة القطط

نمر

Order Carnivora

Fam. Felidae

Leopard, " Nimr"

Panthera pardus (Linnaeus, 1758)

1758. **Felis pardus** Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed : 1: 41

1816. **Panthera vulgaris** Oken, Lehrb. Nat. 3: 1058

1902. **Felis pardus** Anderson, Zoology of Egypt : 183

1951. **Panthera pardus** Ellerman & Morrison -Scott: 316

الحجم في النمر (شكل ٥٦) كبير والذيل طويل فطول الجسم والرأس حوالي ١٢٠ سم والذيل ٩٥-٦٠ سم والارتفاع عند الكتفين ٤٥-٤٢ سم . الفراء أصفر باهت على السطح الظاهري مع بقع بنية أو سوداء كاملة الاستدارة على الرأس والعنق والصدر وحلقية على الظهر والبطن والجانبين الأذن سوداء من الخلف وبها بقعة بيضاء .

النمر أخطر الأنواع لفصيلة القطط وهو أشد ضراوة من الأسد والببر ، يميل إلى سفك الدماء لشهوة في القتل يأكل أقل مما يقتل ، يتغذى على الماشية والغزلان والطيور والقوارض والزواحف ويهاجم الإنسان في شراسة . يجيد السباحة ، كما أنه ماهر في تسلق الجبال .

التوزيع العام للنوع : واسع الانتشار وخاصة بالدول الآسيوية ، كما يوجد بالسعودية - سوريا - لبنان - اسرائيل - مصر - الجزائر - المغرب - السودان - إثيوبيا - الصومال - وجنوب أفريقيا

التوزيع بجمهورية مصر العربية : وجد الحيوان بالمناطق الآتية :-

أ - جنوب سيناء ممثلاً تحت نوع *jarvisi*

ب - الصحراء الغربية ممثلاً تحت نوع *pardus*

Order Carnivora

Fam. Felidae

Caracal, Lynx, "Um Rishat"

رتبة آكلات اللحوم

فصيلة القطط

أم ريشات

Caracal caracal (Schreber, 1776)

1776. **Felis caracal** Schreber, Die Saugeth : 587

1902. **Felis caracal** Anderson, Zoology of Egypt : 184

1951. **Felis caracal** Ellerman & Morrison-Scott: 310

1980. **Caracal caracal** Osborn & Helmy, Fieldiana Zoology: 448

لعل أهم مميز "أم ريشات" (شكل ٥٥) وجود خصلة من الشعر الطويل الأسود في نهاية كل أذن . الحجم متوسط والذيل قصير أسود اللون في طرفه . الأرجل طويلة الفراء .
بني ضارب إلى الأحمرار على السطح الظهرى خالٍ من البقع ، أبيض على السطح البطنى .
طول الرأس والجسم في النوع الأوروبي حوالي ٨٣ سم والذيل ١٢ سم والأرتفاع عند الكتفين
٧٠ سم . يوجد عادة بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية لأوروبا وأسيا وأفريقيا ويتجذى
على القوارض والغزلان الصغيرة كما يتتجذى على الطيور والزواحف .

التوزيع العام للنوع : الهند - أفغانستان - ايران - تركيا - سوريا - الأردن -
اسرائيل - مصر - السعودية - ليبيا - الجزائر - المغرب - السودان - أثيوبيا -
والصومال

التوزيع بجمهورية مصر العربية : عرف الحيوان من ستة مواقع هي حسب ما ذكره
اسبردون وحلمي (١٩٨٠) : الطور (١٩٠٢) والعريش (١٩٢٠) بشبه جزيرة سيناء والسويس
(١٩٠٢) والقاهرة في فم الخليج بمصر القديمة (١٩٠٤) وجبل المقطم (١٩٣٩) وبيرابرق
بالصحراء الشرقية (١٩٤٠) وذلك عن عينة بكل موقع .

Order Carnivora	رتبة آكلات اللحوم
Fam. Felidae	فصيلة القطط
Wild Cat	قط جبلي ليبي

***Felis sylvestris* Schreber 1777**

1777. ***Felis (Catus) silvestris*** Schreber, Saugth. 3: 397. Germany .

1780. ***Felis libyca*** Forester in Buffon's Nat. Vierf. Thiere,87.

1902. ***Felis libyca*** Anderson Zoology of Egypt : 171.

1980. ***Felis sylvestris libyca*** Osborn & Helmy, Fieldiana Zoology, 1309: 443 .

فى القط الجبلى الليبى (شكل ٥٤) الذيل طويل ويعادل $\frac{2}{3}$ طول الرأس والجسم . لون الفراء على السطح الظهرى رملى أصفر أو رمادي باهت ، وعلى السطح البطنى أبيض اللون تظهر على الجسم خطوط دائيرية متصلة أو متقطعة ، ذات لون رملى محمر، كما تظهر بقع سوداء على بعض أجزاء الفراء وللأرجل نفس تخطيط الجسم ، وباطن القدم أسود اللون وعلى الذيل توجد حلقات سوداء بالتبادل مع حلقات رمادية اللون وطرف الذيل أسود طول الرأس والجسم فى تحت نوع " ليبيكا" ٥٤٩ (٤٨٢-٣٧٣) ٦ والذيل ٢٩١ ر ٢٣٧ (٢٣٧-٢٣٧) ٦ والقدم ٨ ر ١٢٤ (١٣٦-١١٠) ٦ والأذن ٥ ر ٦١ (٦٠-٥٦) ٦ والجمجمة ١ ر ٨٣ (٩٠-٧٠) ٦ والوزن ٥ ر ٢٨ كجم .

التوزيع العام للنوع : واسع الانتشار إذ يوجد بمصر -الأردن - سوريا - لبنان - اسرائيل - العراق - ايران - السعودية - السودان - المغرب - الصومال - الهند - وباكستان .

التوزيع بجمهورية مصر العربية : وجد الحيوان بالمناطق الآتية :-

أ - الدلتا ووادي النيل والمصحراء الغربية ممثلا تحت نوع *libyca*

ب - شبه جزيرة سيناء ممثلا تحت نوع *tristrami*

Order Carnivora

رتبة آكلات اللحوم

Fam. Felidae

فصيلة القطط

Jungle Cat

قط بري نيلي

***Felis chaus* Guldenstaedt 1776**

1776. *Felis chaus* Guldenstaedt, Nov. Com. Acad. Petrop. 20:483.

1898. *Felis chaus nilotica* De Winton, Ann. Mag. Nat. Hist., 2: 292.

Near Gairo, Egypt.

فى القط البرى النيلي (شكل ٥٣) الحجم كبير والأقدام عريضة بها خمسة أصابع بالاطراف الامامية وأربعة أصابع بالاطراف الخلفية ذات مخالب حادة تنكمش داخل أغمادها . الذيل قصير نسبياً ويساوي $\frac{1}{3}$ طول الرأس والجسم وعليه حلقات سوداء بالتبادل مع حلقات رمادية اللون ونهاية الذيل سوداء .. الأذن صغيرة ولها خصلة من الشعر القصير . طول الرأس والجسم فى تحت نوع " نيلوتكا " ٥٦٤ (٦٧٤-٥٩٥) ١٢ والذيل ١٢ (٧٦٠-٥٩٥) والقدم ١٦٨ (١٧٨-١٤٥) ١٢ والأذن ٤١ (٧١-٦٣) ١٢ والجمجمة ١١٢ (٢٨٠-٢١٠) ١٢ والوزن ٩٦ كجم (١١٢-٩٨) ١٨ .

يوجد في حقول الشعير والفول وفي أراضي المستنقعات التي يكثر بها نبات البوص .
التوزيع العام للنوع :واسع الانتشار إذ يوجد بمصر - سوريا - العراق - تركيا -
إيران - الهند - أفغانستان - روسيا

التوزيع بجمهورية مصر العربية : دلتا النيل - ووادي النيل جنوباً حتى أسوان وكذلك الساحل الشمالى لصحراء مصر الغربية وواحتى الداخلة والفرافرة .