

Caracteres.—Orejas algo más grandes que en *Felis*, con un pincel ó mechoncillo de pelos tiesos en la punta; miembros más bien largos que cortos; garras retráctiles; plantas de los pies velludas, excepto en el centro y debajo de los dedos. Cola generalmente corta.

Fórmula dentaria: $i \frac{3-3}{3-3}$, $c \frac{1-1}{1-1}$, $pm \frac{2-2}{2-2}$, $m \frac{1-1}{1-1} = 28$. Los dientes como en *Felis*, salvo que falta el pequeño premolar maxilar anterior, y que el carnívero mandibular tiene, además de las dos puntas grandes, un talón ó cúspide posterior rudimentaria.

Especie tipo.—*Lynx lynx* Linné, de Suecia.

Este género comprende cerca de una docena de especies (1) distribuidas por las regiones paleártica, neártica y etiópica. En la Península Ibérica sólo existe una.

Lynx pardellus Miller.

(Lám. X).

Felis lynx Asso (no Linné), Introd. Oryctogr. et Zool. Arag. (1784), pág. 56.

Felis pardina Temminck (no Oken), Monogr. de Mamm., 1 (1824), pág. 116.

Lyncus pardinus Gray, List. Mamm. Brit. Mus. (1843), pág. 46.

Lynx pardinus Brehm, La Vie des Anim., ed. Gerbé, 1 (1868), pág. 308, fig. 148.

Lynx pardella Miller, Ann. and Mag. Nat. Hist., Ser. 7, xx (1907), pág. 398.

Lynx [Eucervaria] pardina Trouessart, Mammif. d'Europe (1910), pág. 104.

Lynx [Eucervaria] pardella Trouessart, l. c. (1910), pág. 105.

NOMBRES VULGARES: *Lobo cervical*, *Lince*, *Gato clavo*, *Gato cervical*, *Lubicán*, en castellano; *Gat cervical*, *Llop cervec*, en catalán; *Lynce*, *Gato cravo*, en portugués.

Diagnosis.—Una especie más pequeña que el lince de la Europa central y septentrional, con la cola más corta y el pelaje sembrado de manchas pequeñas y muy numerosas.

Caracteres.—Orejas grandes, con pincel largo y poblado; cara rodeada de pelos muy largos, formando grandes patillas, péndulas y terminadas en punta; miembros prolongados y robustos; cola corta y no muy gruesa.

Color ante rosado sucio, pasando sobre el lomo y parte superior de la cabeza á leonado-aceituna y tirando en las extremidades y

(1) Este número ascendería casi al doble si, á imitación de los autores norteamericanos, diésemos valor específico á una porción de formas que evidentemente no son sino subespecies del *Lynx ruffus* ó del *L. canadensis*.

en las ingles á ante ocráceo. Todo el tronco y los miembros sembrados de manchitas negruzcas de forma alargada y de unos 10 ó 12 milímetros de diámetro. Las partes inferiores son de un blanco sucio, teñido ligeramente de ante y con manchas más grandes, pero muy desvanecidas. Una ancha franja negruzca cruza la cara interna del antebrazo. Los pies tienen pocas manchas, ó ninguna, y su planta es de un negro sucio que en la parte central pasa á castaño oscuro. Las mejillas son de un gris claro; el ojo está rodeado de blanco sucio, y de su ángulo externo arranca una lista negra que cruza la mejilla. A excepción de su extremo, que desde el borde del labio está ocupado por una mancha negra, la quijada es blanca, lo mismo que la garganta y la parte de las patillas contigua á la cara. Cada patilla es en su borde externo de color pardo Van Dyk, y este matiz está separado de la parte blanca por una ancha banda negra. Las orejas negras en la base y en la punta, y pardas de brécol en el centro. El pincel auricular es negro. La cola del mismo color que el cuerpo, con algunas motas negruzcas que en su segunda mitad tienden á formar fajas, y la punta negra.

El matiz general del pelaje es unas veces más gris y otras más leonado, lo que en parte depende de la edad, y también se observa alguna variante por lo que respecta á las manchas. Hay ejemplares en que algunas de éstas, especialmente en los flancos, parecen tender á agruparse para formar rosetas como las de la pantera, y en tal caso suele ser el espacio comprendido entre las tres ó cuatro manchitas agrupadas un poco más oscuro que el resto del fondo. También se ven individuos con las manchas menos numerosas que de ordinario, pero en cambio más grandes, hasta de 20 mm. de diámetro.

Cráneo con el perfil superior muy convexo, debido á la considerable elevación de la región interorbitaria. Molar inferior con la cúspide posterior rudimentaria muy pequeña.

Dimensiones de un macho viejo, de la Serranía de Córdoba: cabeza y cuerpo, 850 mm.; cola, 127; oreja, 78; pie posterior, 196.

Cráneo (fig. 57): longitud cóndilobasal, 119 mm.; ancho cigomático, 94,2; ancho interorbitario, 29,8; estrechamiento postorbitario, 38,8; mandíbula, 90,5; serie dental superior, 39,7; $pm^3 + pm^4$, 25,2; serie dental inferior, 47; serie molariforme inferior, 31,5.

Distribución geográfica.—Toda la Península, en los montes y

cotos alejados de los grandes centros de población. En el norte y este parece hallarse extinguido, ó por lo menos es muy raro, mien-




FIG. 57.
Cráneo de *Lynx pardellus*. $\times \frac{1}{2}$.

tras que en el centro y mediodía todavía abunda. No existe en las Baleares. Localidad típica, el Coto Doñana, en el bajo Guadalquivir.

La misma especie se halla en Córcega, Cerdeña, Italia, Turquía, Grecia y el Cáucaso, y en la Transcaucasia está representada por una forma local (*L. pardellus orientalis* Satunin).

Observaciones.—Este linco ha sido durante largo tiempo conocido como *L. pardina*, por haberle llamado así Temminck, en la creencia de que era el mismo animal descrito bajo este nombre por Oken (1), de Turquía y Berbería; pero de la breve descripción de este último autor se deduce que su *Lynx pardina* es una especie con el pelaje rayado, acaso una forma de *Felis ocreata*. En vista de la imposibilidad de aplicar esta descripción, y por consiguiente el nombre á que corresponde, á un animal moteado como es nuestro linco, el profesor Miller ha propuesto recientemente llamar á éste *L. pardellus*.

Creo poder asegurar que esta hermosa especie es la única del género *Lynx* que existe en la Península Ibérica. Algunos autores, entre ellos Graells, mencionan también el *L. lynx*, pero evidentemente es un error al que muy bien puede haber dado motivo la ligera variabilidad que, como más arriba se ha dicho, presentan las manchas del *L. pardellus*. Los autores franceses citan el *L. lynx* en los Pirineos, pero, aparte de que los lince parecen haber sido completamente exterminados en dicha cordillera, convendría comprobar si los ejemplares allí obtenidos en otro tiempo no eran realmente de la especie común de nuestra Península. Por lo menos, puede asegurarse que el *L. pardellus* ha existido en el sur de Francia durante el cuaternario (2). Brehm afirma de un modo concreto que esta especie es la que vive, ó vivía cuando se publicó su famosa obra *Thierleben*, en la vertiente meridional de los Pirineos.

En los sitios donde todavía se encuentra, habita el linco las sierras y los montes de bosque muy espeso, así como los terrenos descubiertos donde abunda la maleza, especialmente la carrasca y el romero. Se encama entre los matorrales, y persigue á los corzos, cervatillos, jabatos, conejos y perdices.

(1) *Lehrbuch der Zoologie*, III, 2, pág. 1051.

(2) Véase Harlé, *Bull. Soc. Géol. de France*, Ser. 4, x, 1910, pág. 46.